

La leptospirose



La leptospirose est une maladie bactérienne qui représente une menace sérieuse pour la santé humaine et animale, causée par des bactéries du genre *Leptospira*, qui peuvent survivre plusieurs semaines dans un environnement humide.

Cette maladie se transmet principalement par l'urine d'animaux infectés, notamment les rongeurs comme les rats. Le mode de contamination se fait généralement par contact des muqueuses (œil, nez, bouche) ou de la peau en cas de lésion (égratignures, plaies) avec un environnement contaminé par ces urines.

600 cas

humains signalés chaque année en France métropolitaine (mais ce chiffre est bien plus élevé dans les zones tropicales).

Jusqu'à 40%

de mortalité chez le chien dans les cas sévères.

Les symptômes varient d'une simple fièvre à de forts maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires, abdominales, à des complications graves telles que l'insuffisance rénale, des hémorragies et des atteintes neurologiques.

Chez les animaux, la leptospirose peut également provoquer des formes graves. Les chiens peuvent présenter des symptômes similaires à ceux des humains, comme une insuffisance rénale aiguë, une atteinte hépatique ou des hémorragies pulmonaires.

Les mesures de prévention

Lutte contre la prolifération des rongeurs : contrôle des populations.

Protection contre la contamination par les urines : équipement en cas d'activité à risques (gants, bottes, combinaison, lunettes...)


En cas de plaie : protéger la plaie avec un pansement imperméable. Attention il ne faut pas rincer la plaie avec une eau non potable même limpide.

En cas de « contact à risque » : laver abondamment à l'eau potable et au savon et désinfecter avec un antiseptique.

Si des symptômes apparaissent à la suite d'une situation à risque : consulter rapidement un médecin en lui signalant l'activité à risque pratiquée.

La prévention est essentielle pour contrôler la leptospirose. En cas d'infection, un traitement antibiotique précoce est crucial pour réduire la gravité de la maladie et prévenir les complications.

Tous les chiens sont à risque de leptospirose.



Des vaccins sont disponibles pour les chiens et peuvent leur sauver la vie. La primo-vaccination se fait en deux injections à 3 ou 4 semaines d'intervalle et le rappel est annuel. Demandez conseil à votre vétérinaire.